

米国感染症学会(IDSA)COVID-19診療ガイドラインの概観 (8.0.0版、2022年3月23日時点)*

推奨番号	薬剤名	曝露後予防: 曝露かつ健常	歩行可能: 軽症から中等症	入院: 軽症から中等症。但し酸素不要。	入院: 重症から超重症(室内気でSpO2 94%以下)	入院: 超重症(ICUで人工呼吸管理、ショック、ECMOなど)
	1 ヒドロキシクロロキン(HCQ)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)
	2 HCQ+アジスロマイシン	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	推奨しない(2/4点)	推奨しない(2/4点)	推奨しない(2/4点)
4,5,6	3 曝露後HCQ	推奨しない(3/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
	ロピナビル+リトナビル	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)	推奨しない(3/4点)
7,8,9	副腎皮質ステロイド薬	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用しない事を示唆する(2/4点)	使用を示唆する(3/4点)	推奨する(3/4点)
10	吸入ステロイド	N/A(記載なし、査読なし)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(3/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
11	トシリズマブ	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	使用を示唆する(2/4点)
12	サリムマブ	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(1/4点)	使用を示唆する(1/4点)
13,14	回復者血漿	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(1/4点)	使用しない(3/4点)	使用しない(3/4点)	使用しない(3/4点)
15,16,17	レムデシビル	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	使用を示唆する(2/4点)3日	使用を示唆する(3/4点)	ルーチンでは使用しない事を示唆する(1/4点)
					使用を示唆する(2/4点)5vs10日	
18	ファモチジン	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)
19	曝露前抗体薬 (tixagevimab/cilgavimab)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
20	曝露後抗体薬 (casirivimab/imdevimab)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
21	中和抗体薬 (bamlanivimab/etesevimab もしくは、casirivimab/imdevimab もしくは sotrovimab)	使用を示唆する(3/4点)	使用を示唆する(3/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
22	中和抗体薬 (bebtelovimab)	N/A(記載なし、査読なし)	臨床研究レベルでの推奨(知識の乖離あり)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
23	バムラニビマブ単剤	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	推奨しない(3/4点)	N/A(記載なし、査読なし)
24	バリシニチブ+レムデシビル+副腎皮質ステロイド薬	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(3/4点)	N/A(記載なし、査読なし)
25	バリシニチブ+レムデシビル	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)
26	トファシチニブ	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)
27,28	イベルメクチン	N/A(記載なし、査読なし)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)	臨床研究レベルを除いて使用しない事を示唆する(1/4点)
29	フルボキサミン	N/A(記載なし、査読なし)	臨床研究レベルでの推奨(知識の乖離あり)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
30	ニルマトレルビル/リトナビル	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)
31	モルヌピラビル	N/A(記載なし、査読なし)	使用を示唆する(2/4点)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)	N/A(記載なし、査読なし)

*いずれも4点満点で、その推奨度の強さを示している。